

XXVI ENCUENTRO NACIONAL DE ORNITOLOGIA 2011

Durante la asamblea de RNOA, efectuada en Soata, se selecciono a la ABO (Asociación Bogotana de Ornitología), como organizadora del encuentro que se efectuara los días 12 al 15 de agosto, en el club Campestre El bosque, Ubicado en Sylvania (Cundinamarca). Los sitios de pajareo están ubicados entre los 1.000 a 3.500 metros

Puente Icononzo (Pandi), la Aguadita (Fusagasuga), Cerro Quinini (Tibacuy), Reserva Roble Hueco (Tena), Parque Chicaque (Soacha) y Paramo Sumapaz (Pasca).

Durante el ENO, se efectuaran las siguientes actividades: la copa Tingua Moteada, con la participación de todas las organizaciones ornitológicas del país, concursos de fotografía y curso de latín!!!

Y diversas y alegres pajareadas donde se observaran los endémicos y casi endémicos de nuestra región: *Gallinula melanops*, *Amazilia cyanifrons*, *Coeligena prunellei*, *Myarchus apicalis*, *Xenopipo flavicapilla*, *Synallaxis subpudica*, *Scytalopus griseicollis*, *Cistothorus apolinari*, *Dacnis hartlaubi* y *Euphonia concinna* entre otras interesantes aves!!!

Videos de estas aves aquí:

<http://www.youtube.com/watch?v=VR5cYAMExYU> (Dacnis hartlaubi)

<http://www.youtube.com/watch?v=oaYXGi8MbGw> (Xenopipo flavicapilla)



Dacnis Turquesa (Foto Oswaldo Cortes)



Bosques en la reserva chicaque

Contáctenos para mayor información: abo@rnoa.org

Una especie nueva de tororoi (*Grallaria urraoensis*) del sector norte de la Cordillera Occidental de los Andes colombianos

Durante prospecciones de campo, adelantadas en los bosques altoandinos del Páramo de Frontino, sector norte de la Cordillera Occidental de los Andes de Colombia. La nueva especie es similar al Tororoi de Miller (*Grallaria milleri*) de la Cordillera Central, pero difiere de esta especie en sus vocalizaciones y por ser ligeramente más grande, sin banda pectoral, con coloración café-oliva más opaca por encima, gris claro uniforme en las partes inferiores y bridas blanquecinas. La nueva especie se encuentra en el sotobosque de bosques nublados primarios y secundarios dominado por bambúes del género *Chusquea* entre elevaciones de 2500 a 3200 m en la localidad tipo. Presentamos anotaciones sobre la ecología, distribución, comportamiento, reproducción, vocalizaciones y conservación de esta nueva especie. Los bosques de montaña del norte de la Cordillera Occidental donde se encuentra el Tororoi de Urrao están amenazados debido a deforestación, fragmentación y exploración minera. Estos factores, junto con la

distribución geográfica y ecológica restringida de la nueva especie, hacen altamente prioritarios esfuerzos para su conservación.

Más información:

<http://www.ornitologiacolombiana.org/oc9/MS1004%20Caranton.pdf>



Grallaria urraoensis (Foto Diego Caranton)

ROBERTO CHAVARRO. Galardonado con el premio Rodrigo Vélez de Bedout 2010

La Junta Directiva de RNOA, galardono al Doctor, Roberto Chavarro con el premio Rodrigo Velez de Bedout, por su dedicada y sobresaliente labor en la región de Rogitama del Municipio de Arcabuco (Boyacá), donde por años y paciencia; Roberto logro incentivar en la comunidad local y gracias a la ayuda de su familia, la pasión y respeto por los bosques en Rogitama, conllevando con gran éxito en la recuperación e incremento en la población del colibrí; Príncipe de Arcabuco (*Coeligena prunellei*).

Hoy en día es un sitio obligatorio de paso por muchos naturalistas que adelantan investigaciones, observaciones, monitoreo y admiración por la biodiversidad presente.

Gracias Roberto por haber logrado “De lo denudado a lo Biodiverso”.



Principe de Arcabuco (Foto Roberto Chavarro)





Robeeto, Recibe el premio Rodrigo Velez